


PROVENGE[®]

(sipuleucel-T)

Piense **más** en **las ocasiones especiales.**

Piense **menos** en el **cáncer.**

¡Inicie **PROVENGE** hoy!



Guía de tratamiento de PROVENGE

Qué esperar y más información.

Vea el reverso de este folleto para conocer información importante de seguridad adicional

Visite **www.PROVENGE.com** para obtener más información.



SU RECORRIDO COMIENZA AQUÍ

En esta guía, descubrirá lo que puede esperar durante todo el proceso del tratamiento y cómo prepararse para cada cita. Para obtener más información sobre PROVENGE, visite www.PROVENGE.com o pregúntele a su médico.



Día 1. Recolección de células

Paso 1: Recolección de células

Qué esperar:

El tratamiento comienza en el centro de hematología local, con la leucaféresis, un proceso de recolección de células de 2 a 4 horas de duración, en el que la sangre pasa por una máquina que extrae una cantidad pequeña de células inmunes, junto con algunas plaquetas y glóbulos rojos. El resto de la sangre se reingresa en el cuerpo.

Durante el proceso de recolección de células, puede sentir escalofríos, fatiga o un hormigueo suave en las manos y los pies.

Cómo prepararse:

- Beba una mayor cantidad de agua durante los días previos a su cita, para mantenerse hidratado.
- Evite consumir bebidas con cafeína el día de su cita.
- Consuma alimentos ricos en calcio, como lácteos, verduras de hojas verde oscuro o suplementos.
- Consuma una comida sustanciosa dentro de las cuatro horas previas a la cita.
- Vista prendas holgadas, con mangas que puedan levantarse hasta arriba del codo.
- Traiga una identificación actual con fotografía.
- Considere programar su transporte para asistir a la cita y para regresar luego de esta.



Días 3 o 4. Transfusión del paciente

Paso 2: Transfusión de PROVENGE

Qué esperar:

La transfusión de PROVENGE se realizará en el consultorio o en el centro de transfusión de su proveedor de atención médica. El proceso tomará alrededor de una 1 hora, y, luego de la transfusión, usted será supervisado durante 30 minutos.

Cómo prepararse:

- Vista prendas holgadas, con mangas que puedan levantarse hasta arriba del codo.
- Traiga una identificación actual con fotografía.

El tratamiento de PROVENGE se puede completar en más o menos un mes.

El proceso de tratamiento de PROVENGE incluye 3 ciclos personalizados que utilizan sus propias células inmunes, y las activa para empoderar su sistema inmunológico. Este proceso se puede completar en 6 citas, que se describen en la página anterior, a lo largo del transcurso de más o menos un mes.

Es importante tener todas sus citas programadas para evitar retrasos en su tratamiento.

Cada paciente recibirá un Kit de Cuidados del Paciente que contiene elementos que harán que sus próximas citas sean lo más cómodas posible.



*Hidrátese
Manténgase abrigado y cómodo*



■ Recolección de células
■ Transfusión de PROVENGE

Los efectos secundarios más comunes de PROVENGE son, generalmente, de leves a moderados y bien tolerados.

Han ocurrido acontecimientos adversos serios en algunos hombres que recibieron PROVENGE. Comuníquese con su médico de inmediato si experimenta algún efecto secundario.

El 95% de los efectos secundarios relacionados con la transfusión fueron de leves a moderados.

En ensayos clínicos controlados, el 71.2% de los hombres que recibieron PROVENGE desarrollaron una reacción aguda a la transfusión, la mayoría de las cuales fueron de leves a moderadas. Estas incluyeron fiebre y escalofríos, que normalmente se resolvían en un plazo de 2 días (71.9% y 8 %, respectivamente).

Los efectos secundarios más comunes de PROVENGE son:

- Escalofríos
- Fiebre
- Náuseas
- Dolor de cabeza
- Fatiga
- Dolor de espalda
- Dolor en las articulaciones

Vea el reverso de este folleto para conocer información importante de seguridad adicional o visite www.PROVENGE.com

PROVENGE®

(sipuleucel-T)

INDICACIÓN

PROVENGE® (sipuleucel-T) es un medicamento con receta que se emplea para tratar a ciertos hombres con cáncer de próstata avanzado. PROVENGE es una inmunoterapia celular establecida y adaptada para cada persona, ya que usa sus propias células inmunes.

INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD

Antes de recibir PROVENGE®, infórmele a su médico sobre cualquier condición médica, incluidos problemas cardíacos o pulmonares, o si ha sufrido un derrame cerebral.

Dígale sobre cualquier medicamento que tome, incluidos medicamentos con y sin receta, vitaminas o suplementos dietéticos.

Los efectos secundarios más comunes de PROVENGE comprenden escalofríos, fatiga, fiebre, dolor de espalda, náuseas, dolor en las articulaciones y dolor de cabeza. Estos no son todos los posibles efectos secundarios del tratamiento con PROVENGE.

PROVENGE está hecho de sus propias células inmunes que son recolectadas durante un proceso llamado leucaféresis. Las células son procesadas, regresadas y luego introducidas nuevamente al paciente a través de una transfusión intravenosa (IV) aproximadamente 3 días después. Este proceso se completa en 3 ciclos, con aproximadamente 2 semanas de diferencia entre cada uno. Cada transfusión toma 1 hora aproximadamente, y necesita una supervisión de 30 minutos después de realizada.

La transfusión de PROVENGE puede causar reacciones graves. Informe a su médico de inmediato si experimenta lo siguiente:

- Presenta signos de un ataque al corazón o problemas pulmonares, como dificultad para respirar, dolor torácico, latidos cardíacos acelerados o irregulares, presión arterial alta o baja, mareos, desmayos, náuseas o vómitos.
- Presenta signos de un derrame cerebral, como entumecimiento o debilidad en un lado del cuerpo, disminución de la visión en un ojo o dificultad para hablar.
- Desarrolla síntomas de trombosis, que pueden incluir los siguientes: Dolor o hinchazón de un brazo o una pierna con calor en el área afectada, cambio en la pigmentación de un brazo o una pierna, dificultad para respirar, dolor torácico que empeora cuando respira profundamente.
- Presenta signos de infección, como fiebre de más de 100°F, enrojecimiento o dolor en el área de inserción de la aguja.

Infórmele a su médico sobre cualquier efecto secundario que le preocupe o que no desaparezca. Para obtener más información, hable con su médico.

Le recomendamos que le informe a la Administración de Alimentos y Medicamentos (Food and Drug Administration, FDA) sobre efectos secundarios negativos de medicamentos con receta.

Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la información de prescripción completa adjunta.

